

Su uso no es una alternativa a la cirugía, sino un eslabón diferente en el tratamiento de los pacientes, utilizándose a veces ambos tratamientos.

El tratamiento se le administrará por vía intravenosa en la Sala de Cuidados de la Unidad de Endoscopias por el enfermero responsable de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Durante la administración permanecerá en esta sala bajo el control y vigilancia del enfermero responsable, y en caso de precisar, por el médico digestólogo de guardia. Cada dosis se administra durante aproximadamente 3 horas. La segunda y tercera dosis de IFX se administrarán 2 y 6 semanas después del inicio del tratamiento, respectivamente, y posteriormente cada 8 semanas (dosis de mantenimiento), si bien las pautas podrían cambiar en algunos casos.

Teléfonos de Contacto:

Secretaría del Área de Digestivo: 968.369487

Puri (Busca Supervisora de Área): 83114, a través de la centralita del Hospital: 968369500


Área Digestivo
Arrixaca
Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Infliximab (Remicade®)



Información para pacientes

Actualmente se sabe que una sustancia llamada TNF es una de las principales responsables de la inflamación intestinal. Infliximab (IFX) es un fármaco diseñado para controlar dicha inflamación, ya que disminuye el efecto del TNF, además de producir la muerte de los linfocitos que se encuentran anormalmente activos. Se ha demostrado ser eficaz en el tratamiento en las personas que no responden adecuadamente al tratamiento con otros fármacos.



La administración de Infliximab conlleva una serie de riesgos, entre los que se encuentra:

- » Durante o después de la administración se pueden presentar dolor de cabeza, náuseas, alteraciones en la tensión arterial, picor, fiebre, sofocos, erupciones en la piel, dolor abdominal, tos, diarrea y dolor de garganta.
- » Durante el tratamiento, el paciente es más susceptible a las infecciones, ya que el fármaco disminuye las defen-

sas. Algunos pacientes han desarrollado infecciones leves como resfriado común, pero también se han descrito casos de desarrollo de algunas infecciones graves, como neumonía o tuberculosis. Por ello, para evitar esto, se realiza a todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento la prueba de la inyección subcutánea de la tuberculina (Mantoux) y una radiografía de tórax, para ver si ha estado previamente en contacto con la bacteria que produce la tuberculosis.

- » Las mujeres en edad fértil no deben quedarse embarazadas durante los 6 meses posteriores a la última administración de Infliximab, debiendo usar anticonceptivo, ya que el fármaco pueda afectar al sistema inmune del recién nacido.
- » Debe ponerse en contacto con el enfermero de EII o su médico especialista, en caso de presentar algún efecto secundario o signo de infección (fiebre, malestar general...).

Se ha demostrado que es un fármaco muy efectivo, y es posible obtener resultados positivos en los pacientes en los que está indicado.