

Anticuerpos anti SSA/Ro	
MÉTODO	Inno-lia. EIA.
PREPARACIÓN	Ayuno 9 horas.
MUESTRA	Suero.
OTRAS MUESTRAS	
VALOR REF.	Negativo.
OBSERVACIONES	

Comentarios:

Se determinan anti SSA/Ro de 52 y anti SSA/Ro de 60 Kd.

Los ác. anti SSA/Ro 52 Kd, están relacionados con el lupus neonatal.

Son la especificidad más prevalente en muchas enfermedades autoinmunitarias, como LES, el síndrome de solapamiento, lupus cutáneo subagudo, lupus neonatal y cirrosis biliar primaria.

Se observan:

40 - 80 % de los pacientes con síndrome de Sjögren primario

30 - 50 % de los pacientes con LES asociado a fotosensibilidad y síndrome seco

75 % de los pacientes con lupus cutáneo subagudo. EMTC con rash malar y fotosensibilidad

En pacientes embarazadas se asocia a lupus neonatal

A menores frecuencias aparece en: artritis reumatoide, esclerodermia, polimiositis y cirrosis biliar primaria. Cuando se detecta el componente de 60 Kd. en ausencia del componente de 52 Kd y anti La es muy indicativo de LES.

INTERFERENCIAS			
SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS

ENFERMEDADES / ALTERACIONES	
Artritis reumatoide	▲
Lupus eritematoso sistémico	▲
Síndrome de Sjögren	▲