

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA SOLICITUD DE QUIMIOPROFILAXIS PREOPERATORIA:

Nombre del enfermo _____ N°H° _____ Cama: _____ Diagnóstico: _____ Fecha: _____	Facultativo: Firma:
---	----------------------------

FECHA DE LA INTERVENCIÓN: _____	QUIRÓFANO N°: _____
---------------------------------	---------------------

ALERGIAS: _____

Según protocolo Guía Quimioprofilaxis del HURS:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cirugía Esofágica: | <input type="checkbox"/> Cefazolina 2g | <input type="checkbox"/> Amoxi/Clavul 2g | <input type="checkbox"/> Clindam 600+Genta 2mg/kg |
| <input type="checkbox"/> Cirugía Gastroduod.: | <input type="checkbox"/> Cefazolina 2g | <input type="checkbox"/> Amoxi/Clavul 2g | <input type="checkbox"/> Clindam 600+Genta 2mg/kg |
| <input type="checkbox"/> Colectomía: | <input type="checkbox"/> Cefazolina 2g | <input type="checkbox"/> Amoxi/Clavul 2g | <input type="checkbox"/> Clindam 600+Genta 2mg/kg |
| <input type="checkbox"/> Colectect. Laparosc: | <input type="checkbox"/> Cefazolina 2g | <input type="checkbox"/> Amoxi/Clavul 2g | <input type="checkbox"/> Clindam 600+Genta 2mg/kg |
| <input type="checkbox"/> Cirugía Int. Delgado: | <input type="checkbox"/> Cefazolina 2g | <input type="checkbox"/> Amoxi/Clavul 2g | <input type="checkbox"/> Clindam 600+Genta 2mg/kg |
| <input type="checkbox"/> Cirugía Colorrectal: | <input type="checkbox"/> Amoxi/Clavul 2g | <input type="checkbox"/> Genta/Tobra 2mg/kg+Metronidazol1g | |
| | <input type="checkbox"/> Cefoxitina 1g | <input type="checkbox"/> Cefuroxima 1.5g+Metronidazol 1g | |
| <input type="checkbox"/> Apendicetomía: | <input type="checkbox"/> Amoxi/Clavul 2g | <input type="checkbox"/> Genta/Tobra 2mg/kg+Metronidazol1g | |
| <input type="checkbox"/> Herniorrafia: | <input type="checkbox"/> Cefazolina 2g IV | <input type="checkbox"/> Amoxi/Clavul 2g IV | <input type="checkbox"/> Clindamicina 600mg |
| <input type="checkbox"/> Mastectomía: | <input type="checkbox"/> Cefazolina 2g IV | <input type="checkbox"/> Amoxi/Clavul 2g IV | <input type="checkbox"/> Clindamicina 600mg |

OTRO MEDICAMENTO: _____

MOTIVO: _____

Antimicrobiano	Dosis/vía/modo de administración	Inicio de la administración
Amoxicilina/Clavulánico	2 g/i.v. en 5´	5´antes de inducción anestésica
Cefazolina	2 g/i.v. en 5´	5´antes de inducción anestésica
Cefoxitina	1 g/i.v. en 5´	5´antes de inducción anestésica
Cefuroxima	1,5 g/i.v. en 5´	5´antes de inducción anestésica
Clindamicina	600 mg/i.v. en 30´	30´antes de inducción anestésica
Genta/Tobramicina	2 mg/Kg/i.v. en 30´	30´antes de inducción anestésica
Metronidazol	1 g/i.v. en 60´	60´antes de inducción anestésica
Vancomicina	1 g/i.v. en 60´	60´antes de inducción anestésica

INDIQUE SI SÓLO PRECISARÁ UNA DOSIS

A CUMPLIMENTAR POR EL SERVICIO DE FARMACIA:

PROCEDE LA DISPENSACIÓN

NO PROCEDE LA DISPENSACIÓN. MOTIVO: _____

Farmacéutico:

Este protocolo de actuación es consecuencia de los acuerdos tomados en la Comisión de Infecciones del HURS que ha sido trasladado a la Junta Facultativa. La Comisión de Infecciones, en la elaboración de la “GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE QUIMIOPROFILAXIS ANTIMICROBIANA EN CIRUGÍA DEL HURS”, ha tenido muy presente las recomendaciones recogidas en el documento elaborado por el Grupo de Infecciones Hospitalarias de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (GEIH-SEIMC) y aquellas modificaciones debidamente justificadas, alcanzando un consenso con los diferentes Servicios Quirúrgicos de nuestro Hospital. De esta forma se responde a la demanda del Plan de Vigilancia del SAS y a uno de los objetivos marcados desde la Dirección Médica de Nuestro Centro.

El circuito de trabajo es el siguiente

Impreso de Solicitud de Tratamiento Quimioproláctico Preoperatorio
(según Guía)



A Servicio de Farmacia



Envío de Kits Monodosis a Planta



Administración en Quirófano por Anestesia

Necesidad de una segunda dosis de antimicrobiano y momento para su administración

Recomendada una segunda dosis de antimicrobiano sólo en dos situaciones:

- Intervenciones de más de 2 horas
- Pérdidas de sangre superiores a un litro

En intervenciones donde el cirujano lo estime conveniente, puede prolongarse hasta un máximo de 24h.

Antimicrobiano	Dosis/vía/modo de administración	Momento de la administración
Amoxicilina/Clavulánico	2 g/i.v.	2 h. de la primera dosis
Cefazolina	2 g/i.v.	4 h. de la primera dosis
Cefoxitina	1 g/i.v.	2 h. de la primera dosis
Cefuroxima	1,5 g/i.v.	2 h. de la primera dosis
Clindamicina	600 mg/i.v.	4 h. de la primera dosis
Genta/Tobramicina	---	Sólo administrar la primera dosis
Metronidazol	500 mg/i.v.	4 h. de la primera dosis
Vancomicina	500 mg/i.v.	4 h. de la primera dosis