



nº historia clínica

**PACIENTE**

apellidos \_\_\_\_\_ nombre \_\_\_\_\_

habitación \_\_\_\_\_ cama \_\_\_\_\_

diagnóstico \_\_\_\_\_

fecha de intervención \_\_\_\_\_ alergias \_\_\_\_\_

**FACULTATIVO**

apellidos, nombre \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

fecha \_\_\_\_\_

quirófano nº \_\_\_\_\_

**CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA  
SOLICITUD DE QUIMIOPROFILAXIS PREOPERATORIA**

**Según protocolo Guía Quimioprofilaxis del HURS**

<input type="checkbox"/> Cirugía limpia con material de fijación permanente	<input type="checkbox"/> Cefazolina 2g IV	<input type="checkbox"/> Vancomicina 500 mg IV
<input type="checkbox"/> Artroplastias de cadera/rodilla	<input type="checkbox"/> Cefazolina 2g IV	<input type="checkbox"/> Vancomicina 500 mg IV

Cirugía limpia con material de fijación permanente \_\_\_\_\_

Laminectomía \_\_\_\_\_

Fracturas abiertas \_\_\_\_\_

*\*Las fracturas abiertas requieren tratamiento, no profilaxis*

otro medicamento \_\_\_\_\_

motivo \_\_\_\_\_

antimicrobiano	dosis/vía/modo de administración	inicio de la administración
Cefazolina	2 g/i.v. en 5´	5´antes de inducción anestésica
Vancomicina	500 mg/i.v. en 60´	60´antes de inducción anestésica

indique si sólo precisará una dosis

**A CUMPLIMENTAR POR EL SERVICIO DE FARMACIA**

procede la dispensación

no procede la dispensación

motivo \_\_\_\_\_

Farmacéutico

Córdoba, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_\_ Firmado \_\_\_\_\_

Este protocolo de actuación es consecuencia de los acuerdos tomados en la Comisión de Infecciones del HURS que ha sido trasladado a la Junta Facultativa. La Comisión de Infecciones, en la elaboración de la "GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE QUIMIOPROFILAXIS ANTIMICROBIANA EN CIRUGÍA DEL HURS", ha tenido muy presente las recomendaciones recogidas en el documento elaborado por el Grupo de Infecciones Hospitalarias de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (GEIH-SEIMC) y aquellas modificaciones debidamente justificadas, alcanzando un consenso con los diferentes Servicios Quirúrgicos de nuestro Hospital. De esta forma se responde a la demanda del Plan de Vigilancia del SAS y a uno de los objetivos marcados desde la Dirección Médica de Nuestro Centro.

el circuito de trabajo es el siguiente

Impreso de Solicitud de Tratamiento Quimioproláctico Preoperatorio (según Guía)



A Servicio de Farmacia



Envío de Kits Monodosis a Quirófano



Administración en Quirófano por Anestesia

**En caso de alergia a betalactámicos se utilizará VANCOMICINA: 1g (ó 500 mg+500 mg) IV en 60 minutos, 1h antes de la inducción anestésica**

#### **Necesidad de una segunda dosis de antimicrobiano y momento para su administración**

Recomendada una segunda dosis de antimicrobiano sólo en dos situaciones

- Intervenciones de más de 2 horas
- Pérdidas de sangre superiores a un litro

antimicrobiano	dosis/vía/modo de administración	momento de la administración
Amoxicilina/Clavulánico	2 g/i.v.	2 h. de la primera dosis
Cefazolina	2 g/i.v.	4 h. de la primera dosis
Cefuroxima	1,5 g/i.v.	2 h. de la primera dosis
Clindamicina	600 mg/i.v.	4 h. de la primera dosis
Genta/Tobramicina	- - -	sólo administrar la primera dosis
Metronidazol	500 mg/i.v.	16 h. de la primera dosis
Vancomicina	500 mg/i.v.	12 h. de la primera dosis