



nº historia clínica

PACIENTE

apellidos _____ nombre _____

FACULTATIVO

apellidos, nombre _____ CNP _____

nº seguridad social/ tarjeta sanitaria _____ diagnóstico _____

centro _____ planta _____ habitación _____ cama _____

fecha de intervención _____ quirófano nº _____ alergias _____

CIRUGÍA UROLÓGICA
SOLICITUD DE QUIMIOPROFILAXIS PREOPERATORIA

Según protocolo Guía Quimioprofilaxis del HURS

☐	Proctastectomía transuretral	Cefazolina 2g IV	5´antes inducción anestésica
☐	Proctastectomía radical	Cefazolina 2g IV	5´antes inducción anestésica
☐	Cistectomía con plastia intestin	Amoxicilina/Clavulánico 2g IV	5´antes inducción anestésica
☐	Cistectomía radical	Amoxicilina/Clavulánico 2g IV	5´antes inducción anestésica
☐	Nefrectomía	Cefazolina 2g IV	5´antes inducción anestésica
☐	Prótesis de pene	Cefazolina 2g IV	5´antes inducción anestésica (+ Gentamicina 2mg/kg 30´antes)
☐	Incontinencia	Cefazolina 2g IV	5´antes inducción anestésica
☐	Cirugía escrotal	Amoxicilina/Clavulánico 2g IV	5´antes inducción anestésica
☐	RTU neo vesical	Cefazolina 2g IV	5´antes inducc anestésica (+Tobra 100mg IV si sonda 30´antes)
☐	RTU hipertrof. benigna próstata	Cefazolina 2g IV	5´antes inducción anestésica
☐	Nefroureterectomía:	Cefazolina 2g IV	5´antes inducción anestésica
☐	Ureteroscopia	Cefazolina 2g IV	5´antes inducción anestésica

otro medicamento _____

motivo _____

antimicrobiano	dosis/vía/modo de administración	momento de la administración
Amoxicilina/clavulánico	2 g/i.v. en 5´	5´antes de inducción anestésica
Cefazolina	2 g/i.v. en 5´	5´antes de inducción anestésica
Genta/Tobramicina	2 mg/Kg/i.v. en 30´	30´antes de inducción anestésica

☐ indique si precisará una segunda dosis

A CUMPLIMENTAR POR EL SERVICIO DE FARMACIA

☐ procede la dispensación

☐ no procede la dispensación

motivo _____

farmacéutico

Córdoba, a ____ de _____ de 200 ____ Firmado _____

Este protocolo de actuación es consecuencia de los acuerdos tomados en la Comisión de Infecciones del HURS que ha sido trasladado a la Junta Facultativa. La Comisión de Infecciones, en la elaboración de la “GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE QUIMIOPROFILAXIS ANTIMICROBIANA EN CIRUGÍA DEL HURS”, ha tenido muy presente las recomendaciones recogidas en el documento elaborado por el Grupo de Infecciones Hospitalarias de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (GEIH-SEIMC) y aquellas modificaciones debidamente justificadas, alcanzando un consenso con los diferentes Servicios Quirúrgicos de nuestro Hospital. De esta forma se responde a la demanda del Plan de Vigilancia del SAS y a uno de los objetivos marcados desde la Dirección Médica de Nuestro Centro.

El circuito de trabajo es el siguiente

Impreso de Solicitud de Tratamiento Quimioproláctico Preoperatorio (según Guía)



A Servicio de Farmacia



Envío de Kits Monodosis a Planta



Administración en Quirófano por Anestesia

**En caso de alergia a betalactámicos se utilizará
CLINDAMICINA 600mg + GENTAMICINA 2mg/kg**

Necesidad de una segunda dosis de antimicrobiano y momento para su administración

Recomendada una segunda dosis de antimicrobiano sólo en dos situaciones

- Intervenciones de más de 2 horas
- Pérdidas de sangre superiores a un litro

antimicrobiano	dosis/vía/modo de administración	momento de la administración
Amoxicilina/Clavulánico	2 g/i.v.	2 h. de la primera dosis
Cefazolina	2 g/i.v.	4 h. de la primera dosis
Cefuroxima	1,5 g/i.v.	2 h. de la primera dosis
Clindamicina	600 mg/i.v.	4 h. de la primera dosis
Genta/Tobramicina	----	sólo administrar la primera dosis
Metronidazol	500 mg/i.v.	16 h. de la primera dosis
Vancomicina	500 mg/i.v.	12 h. de la primera dosis