GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TALAVERA
C/ José Luis Gallo, Nº 2. 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
N.I.F. Q-4500146-H
Telfs.: 925 82 15 09 – 925 82 79 36 / Fax: 925 81 71 08

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

PROTOCOLO PARA EL USO DE AMPOLLAS DE *AMCHAFIBRIN®* EN EXODONCIAS

UNIDAD DE SALUD BUCODENTAL

José Antonio Sabín Jerez
Talavera de la Reina, 27 de abril de 2011

En los pacientes que necesitan una extracción dentaria y están tomando un antiagregante plaquetario o un anticoagulante oral debe advertírselo a su odontoestomatólogo para iniciar el siguiente protocolo.

Un día antes de la extracción hágase un control de INR.

√ Si está bien anticoagulado (INR menor de 2.5), se ha de mantener la dosis diaria que venía tomando del anticoagulante, pudiéndose realizar la extracción. Al día siguiente de la extracción, ha de hacerse un nuevo control para reajustar la dosis.

√ Si el INR es mayor de 2.5, hay que ajustar la dosis del anticoagulante oral antes de realizar la extracción. Reanude la dosis normal el mismo día de la extracción.

La experiencia desarrollada en otros países y en el nuestro señala que no es imprescindible suspender, ni siquiera reducir, la administración de los anticoagulantes orales previamente a extracciones dentales, pero en muchos casos la pauta desarrollada es suspender la toma del anticoagulante oral dos días previos a la intervención y esos mismos días administrar enoxaparina (*Clexane®*).

En el caso de tomar un antiagregante, sería conveniente suspender su toma durante siete días si es posible.

MODO DE APLICACIÓN

Tras la extracción hay que irrigar el alvéolo con una ampolla de ácido tranexámico (*Amchafibrin®*) de 500 mg, recomendándose a continuación dar puntos de sutura en caso de que fuera posible. Si no se sutura se hará compresión sobre la zona con una gasa o algodón empapado con *Amchafibrin®* durante unos minutos. A continuación se ha de controlar el sangrado cada cierto tiempo por si hubiera que renovar la gasa.

Durante dos días después y si existe pequeño sangrado se hará enjuagues suaves tres veces al día con una ampolla de *Amchafibrin®* sin tragárselo y esperará una hora antes de comer o beber.

No olvidar hacer profilaxis de endocarditis bacteriana en el caso de cardiopatía de tipo valvular o una miocardiopatía.