

Título

COMPARACION DE COSTES DE CIRUGÍA AMBULATORIA EN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA VERSUS HOSPITALARIO

Clasificación

03- Atención al cliente y/o paciente

Palabras clave: VASECTOMIA, AMBULATORIA

Autores

ANA ISABEL ETXEBARRIA UGARTE; MARIA ANGELA DE LA IGLESIA ZALBIDEA; ANTONIO GONZALEZ MOYANO; MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ, SUSANA GARATE PEREZ, ELISA GOMEZ INHUESTO, CRISTINA DOMINGO RICO

INTRODUCCION

COMPARAR LOS COSTES DE LA CIRUGIA AMBULATORIA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN RELACIÓN A LOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN EN UN HOSPITAL

MATERIAL Y METODOS

SE EFECTÚA UN CÁLCULO DE LOS COSTES EN AMBOS CENTROS. EN ATENCIÓN PRIMARIA SE DETALLA EL COSTE DE TODO EL MATERIAL FUNGIBLE EMPLEADO HABITUALMENTE MÁS LOS COSTES-HORA DEL PERSONAL MÉDICO (MÉDICO Y MATRONA) Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE SUPONEN LA CONSULTA CON LA MATRONA PARA INFORMAR DE LA TÉCNICA, QUE SE EFECTÚA A UNA MEDIA DE 12 PACIENTES, LA EFECTUADA CON LA MÉDICO, LA INTERVENCIÓN Y LA CONSULTA PARA COMPROBAR LA AZOOSPERMIA. EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO SE ESTIMARON LOS COSTES DE LA CONSULTA DE UROLOGÍA EXTRAHOSPITALARIA, INCLUYENDO EL COSTE DE PERSONAL FACULTATIVO, DE ENFERMERÍA Y GASTOS GENERALES, MÁS EL COSTE DE LA INTERVENCIÓN, QUE INCLUYE EL COSTE DE CIRUJANO Y PERSONAL DE QUIRÓFANO, Y GASTOS GENERALES DE QUIRÓFANO AMBULATORIO. RESULTADOS: EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA, LOS COSTES ESTIMADOS FUERON DE 20,63€ DE LA CONSULTA CON LA MATRONA PARA INFORMAR DE LA TÉCNICA, 54,50€ DE LA PRIMERA Y SUCESIVAS CONSULTAS, 8,22€ COMO COSTES DEL MATERIAL FUNGIBLE Y 3,49€ DE LA ATENCIÓN POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. TODO ELLO HACÍA UN TOTAL DE 99, 86€ POR PACIENTE ATENDIDO EN ATENCIÓN PRIMARIA . EN EL HOSPITAL LOS COSTES ESTIMADOS FUERON: 58,14 € POR LA CONSULTA DE UROLOGÍA EXTRAHOSPITALARIA Y 76,06€ POR LOS COSTES DE LA INTERVENCIÓN, HACIENDO UN TOTAL DE 134, 20€

CONCLUSIONES

LOS COSTES ESTIMADOS EN AMBAS ZONAS SE REALIZARON CON DIFERENTE NIVEL DE DETALLE SIENDO MÁS PRECISOS LOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. AÚN ASÍ, EL COSTE A NIVEL DE PRIMARIA FUE, APROXIMADAMENTE UN 30% MENOR QUE A NIVEL HOSPITALARIO, SIENDO LOS RESULTADOS CLÍNICOS OBTENIDOS SIMILARES.