Título

REDUCIENDO EL NÚMERO DE AMPUTACIONES MAYORES EN PACIENTES DIABÉTICOS: RESULTADOS DE LA UNIDAD DEL PIE DIABÉTICO. 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

Clasificación

01- Accesibilidad de los pacientes

Palabras clave: Amputaciones, víaclinica

Autores

Diego de alcalá Martínez Gómez; Álvaro Campillo Soto; María de los Ángeles Moreno ; José Luis Aguayo Albacini

INTRODUCCION

Las amputaciones mayores de los miembros inferiores son una de las complicaciones más frecuentes, graves y mutilantes de la historia natural del paciente diabético evolucionado. El objetivo de nuestro estudio es valorar los resultados globales, tras 10 años de funcionamiento de la Unidad del Pie Diabético (UPD), comparado con el periodo previo a su funcionamiento.

MATERIAL Y METODOS

En enero de 2000, tras múltiples reuniones interdisciplinares (endocrinología, enfermería, anestesia, cirugía, rehabilitación), se implantó la UPD. Tras 10 años de funcionamiento se comparan los resultados obtenidos con el periodo similar pre-UPD. Se estudia: edad media, nº de amputaciones, control del dolor, costes, exitus y grado de satisfacción. La edad media en el periodo UPD fue de 68 años frente a 65 años del periodo anterior (p=0,017). Los exitus se redujeron del 5% al 1,7% (p=0,022). Las amputaciones mayores se han reducido globalmente un 10% (p=0,005), pudiendo diferirlas (amputaciones más allá de las 36 horas del ingreso) hasta en un 50% de los casos (p<0,001).

CONCLUSIONES

La implantación de la UPD, a pesar del aumento de la edad media de los pacientes, ha permitido reducir el número de amputaciones, los exitus, así como la satisfacción del paciente, todo ello, ligado a una reducción significativa de los costes por proceso.